

Področje Naravnega Parka Rojce (Campagnuzza) - Štandrež (S. Andrea) se deli na štiri dele:

- a) rekreacijsko področje, ki se nahaja na levem delu reke
 - b) stermina, ki se povezuje z obalnim rečnim prodom (strmina naplavljenega terase)
 - c) površina obalnega rečnega proda, ki je povezana z rečno strugo
 - d) Struga reke
- a) Rekreacijska površina je nastala na nasipnih zemljiščih deloma kot posledica naravnega procesa pogozdovanja naslednjih rastlin: sibirski brest (*Ulmus pumila*), črna topola (*Populus nigra*), severnoameriška akacija (*Robinia pseudoacacia*) in visoka pajesen (*Alyanthus altissima*). Tu se nahaja razgledna točka, s širokim pogledom na desni breg reke proti Ločniku, Kalvariji in Podgori.
Pogled sega tja do vzpetin Julijskih Alp (Krn) in Kranjskih Predalp (monte Cavallo).
- b) Strmina ki se povezuje z naplavljenim pasom, je naravna in bolj ali manj strma. Strmi in omejeni predeli, so sestavljeni iz apnenčaste konglomeratne kamnine. Manj strme predele so izoblikovale naplavine. Na umetno terasiranem obrežju poi mostu IX Agosto, rastejo drevesne zimzelene nesajene vrste, popolnoma tuje rečnemu okolju, kakor himafajska cedra, lavanda cipresa in avstrijski črni bor ter spontane primerki koprivovca (*Celtis australis*) in sibirskega bresta. Med Rojcami in Štandrežem, na bolj naravnih in strmih predelih, iz katerih izstopa naravna skala, so tla prekrita z bršljanom (*Hedera helix*) in z redkimi praproti. Manj naravni previsi, so poraščeni z drevesi in grmovnicami. Štandrežko stermino, ponovno prekrivajo samonikle grmovnice in travniki z rastlinjem tipičnim za kraške pašnike in gmajne. Na nekaterih mestih opazimo drsenje prodnatega materiala ob vznožju konglomerator.
- c) Zgornjo plast naplavljenega pasu so izoblikovale usedline peska in blata apnenčastih značilnostih. Tukaj prevladuje goščava v kateri, poleg samoniklih in vpeljanih ekzotičnih dreves kot so: severnoameriška akacija, ameriški javor (*Acer negundo*), sibirski brest, pojesen, se vedno bolj razmnožujejo avtoktona drevesa in grmičevje kot sta Jemen (*Fraxinus excelsia*) in klen (*Acer campestre*). To je dokaz da kljub uničevanju v preteklosti, se pokrajina naravno obnavlja. Naplavljen pas ob reki, ki ga poplave večkrat prizadenejo so zaraščene z robidovjem, drevesi in grmičevjem in z ekzotičnim preraščujočim rastlinstvom, kot so: topinambur (*Helyanthus tuberosus*), Reynoutria japonica, Japonski kovačnik (*Lonicera japonica*) in *Solidago gigante*.
- d) Za strugo, vzdolž jezua, je značilna plast proda, ki se pojavi na več mestih posebno v sušnih obdobjih. Ta pojav, je posledica hudourniške značilnosti reke, katere nivo znatno niha med letom zlasti v času poplav. Naplavine ki so dalj časa suhe so poraščene z nekaterimi rastlinskimi vrstami zlasti z vrbami (*Salix eleagnos* in *Salix purpurea*) in črno Topolo (*Populus nigra*).